

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

- Посещение леса
- Клещ сидит на травинках или ветках кустарников.
- Не может летать и прыгать.
- Может цепляться за жертву.
- Заносятся людьми на одежде, с дарами леса или цветами.

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

- Размер клеща 0,5 до 15 мм.
- Обитает в траве и на кустах не выше метра, как в черте городов, так и сельской местности, в лесах.
- Активен с марта по ноябрь.
- Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяя со слюной анестезирующее и разжижающее в кровь вещество, обезболивающее процесс присасывания.
- Через несколько часов после укуса голова клеща полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ



ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?

Это природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой и преимущественным поражением ЦНС. Может привести к осложнениям и даже смерти заболевшего. Люди и животные заражаются энцефалитом через укусы иксодовых клещей.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

- Укус клеща.
- Раздавливание и втирание присосавшегося клеща.
- Употребление в пищу инфицированного сырого молока и продуктов на его основе в некипяченном виде.



РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Первая фаза. У большинства людей нет ранних симптомов, но иногда они похожи на легкую форму гриппа.

Вторая фаза. Клещевой энцефалит может перейти в тяжёлую форму с лихорадкой, головной болью, тошнотой, рвотой и головокружением. При тяжелом течении может возникнуть стойкий паралич мышц. Возможна и смерть.

ПРОФИЛАКТИКА

- Сделайте прививку против клещевого энцефалита!
- Носите в лесу одежду с длинными рукавами, с плотно застегнутым воротом и манжетами; головной убор; обувь, в которую можно заправить штаны.
- Используйте репелленты.
- Проводите само- и взаимоосмотры.
- Пейте кипяченое молоко.